

**Может ли назначение  
оригинального лекарственного  
средства повысить  
приверженность пациентов к  
лечению?**

**Григорьева Н.Ю.**

Нижегородская государственная медицинская академия

## ***Терапевтическая эквивалентность -***



**Лекарственный препарат является терапевтически эквивалентным, если он содержит ту же самую активную субстанцию или терапевтически активный компонент и клинически проявляет такую же эффективность и безопасность, как препарат, эффективность и безопасность которого установлена.**

# Дизайн исследования



Григорьева Н.Ю. с соавт. Клиническая фармакология и терапия, 2013

## Показатели СМАД у больных сравнимых групп



Григорьева Н.Ю. с соавт. Клиническая фармакология и терапия, 2013

# Показатели СМЭКГ у больных сравнимых групп

Количество эпизодов  
ишемической депрессии  
сегмента ST




Максимальное значение  
сегмента ST, мм



Григорьева Н.Ю. с соавт. Клиническая фармакология и терапия, 2013




## ЧСС исходно и через 12 недель лечения



Григорьева Н.Ю. с соавт. Клиническая фармакология и терапия, 2013

## ЭЗВД исходно и через 12 недель лечения




Григорьева Н.Ю. с соавт. Клиническая фармакология и терапия, 2013

Таким образом, полученные данные об отсутствии влияния на функцию эндотелия у генериков бисопролола, представленных на отечественном фармацевтическом рынке, позволяют прийти к заключению о неравнозначной терапевтической эквивалентности оригинального препарата Конкор и его дженериков.

*Григорьева Н.Ю. с соавт. Клиническая фармакология и терапия, 2013*



## Динамика ОФВ<sub>1</sub> в сравниваемых группах



Григорьева Н.Ю. с соавт. Клиническая фармакология и терапия, 2013